


ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ  
ΑΔΡΟΜΥΚΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ  
ΤΣΟΥΝΑΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΖΟΥΡΒΑΣ  
(ΑΠΟΤΟΜΟΙ ΜΑΡΑΣΜΟΙ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ Ή ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ  
ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ)

**ΒΕΡΤΙΣΙΛΙΟ**



**ΙΣΚΑ**



**ΙΣΚΑ**



**ΦΟΜΑ**



**ΦΟΜΑ**

## ΕΥΤΥΠΙΩΣΗ



- 1) ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΜΕ **ΧΑΛΚΟΥΧΑ** ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ.
- 2) ΑΥΣΤΗΡΑ **ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΩΝ** ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟ ΣΕ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟ (ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΛΩΡΙΝΗΣ ΕΩΣ 10%).
- 3) ΚΛΑΔΕΜΑ ΜΕ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΜΕ **ΠΑΣΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ** ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ.
- 4) ΑΜΕΣΗ **ΚΑΥΣΗ** ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ.
- 5) ΣΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ **ΟΧΙ ΑΡΟΣΗ**.
- 6) ΣΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ **ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ Ph** ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΗ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ (ΣΤΟΧΟΣ Ph ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6,5 ΚΑΙ ΕΩΣ 7,5 ). ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΕΣ.
- 7) ΣΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ, ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ, **ΗΛΙΟΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ** ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ.
- 8) ΣΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ **ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΛΙΜΝΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ** ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ.
- 9) ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ **ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ** ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΥΚΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ **TRICHODERMA** ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ. (ΠΧ REMEDIER)
- 10) **ΛΙΠΑΝΣΗ** ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΜΕ **ΒΟΡΑΚΑ ΚΑΙ ΑΖΩΤΟ** ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
- 11) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΞΗΡΑΝΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΚΡΑΙΑ ΛΕΠΤΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΟΜΟ ΚΗΚΙΔΟΜΥΓΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ.

12) **ΟΧΙ ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ** ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΦΥΤΩΝ ΟΠΩΣ ΠΑΤΑΤΑ ΚΑΙ ΝΤΟΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ.

Στην γεωργική πράξη, πριν της βιβλιογραφικά προτεινόμενης εκρίζωσης, καύσης υπολειμμάτων εκρίζωσης ελαιόδεντρων και απολύμανσης του εδάφους για κάποια χρόνια πριν την νέα φύτευση, εφαρμόζονται τα παρακάτω :

Κλάδεμα των προσβεβλημένων ελαιόδεντρων μέχρι το υγιές ξύλο και εφαρμογή των παραπάνω αν η αποξήρανση δεν είναι πλήρης. Ταυτόχρονα πρόληψη ανάσχεσης μετάδοσης των μυκήτων στα υπόλοιπα ελαιόδεντρα.