

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΛΑΙΩΝΩΝ (ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΒΡΟΧΗ) ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΔΑΚΟΥ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

- ① Η καρποφορία των ελαιώνων κυμαίνεται από 25 έως 30 % .

- ② Εφαρμόζονται έγκαιροι δολωματικοί ψεκασμοί , αλλά σε συνθήκες μικρής καρποφορίας η αποτελεσματικότητά τους είναι περιορισμένη. Παρουσιάζεται σοβαρή αύξηση του αριθμού των δάκνων στο δίκτυο παρακολούθησης δράσης Biii του υλοποιούμενου προγράμματος ΚΑΝ(ΕΕ) 611&615.

- ③ Η παρούσα οδηγία ψεκασμού περιλαμβάνει **μόνο τους ελαιώνες που έχουν καρπό και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός από τον τελευταίο ψεκασμό κάλυψης** (ολική διαβροχή).

- ④ Ο ψεκασμός προτείνεται να **υλοποιηθεί από 5 Σεπτεμβρίου έως 10 Σεπτεμβρίου** (φυσιολογικές θερμοκρασίες, όχι βροχόπτωση).

- ⑤ Τα προτεινόμενα εντομοκτόνα είναι **διασυστηματικά (σκοτώνουν και την pronύμφη – σκουλήκι)** και ο προτεινόμενος ψεκασμός αφορά **μόνο τους συμβατικούς καλλιεργητές** (όχι βιοκαλλιεργητές).

- ⑥ Τα εντομοκτόνα με δραστική ουσία **DIMETHOATE ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ. Απαγορεύεται η χρήση τους.**

Τα εντομοκτόνα με δραστική ουσία **Beta cyfluthrin (Bulldock, Dogo κτλ) ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ** και δεν είναι διασυστηματικά.

Τα λοιπά εντομοκτόνα με δραστική ουσία πυρεθρίνη (πχ Decis) δεν είναι διασυστηματικά.

Τα οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα με δραστική ουσία phosmet (Hexagon, Imidan, Inovitan, Vivio κτλ) δεν είναι διασυστηματικά.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

<i>Thiacloprid</i>	<i>Biscaya 240 OD</i>	400 κ.εκ / χιλιάρι βυτίο	Τουλάχιστον 14 ημέρες πριν την συγκομιδή
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--

Ή

<i>Acetamiprid</i>	<i>Carnadine 20%</i>	500 κ.εκ / χιλιάρι βυτίο	Τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την συγκομιδή
--------------------	----------------------	-----------------------------	---

Ή

<i>Deltamethrine</i> και <i>Thiacloprid</i>	<i>Proteus 110 OD</i>	1000 κ.εκ / χιλιάρι βυτίο	Τουλάχιστον 14 ημέρες πριν την συγκομιδή
--	-----------------------	------------------------------	--

Και

ΧΑΛΚΟΥΧΟ (μειωμένη δοσολογία)

ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ	30 WG 35 WG	2 κιλά / χιλιάρι βυτίο 1,7 κιλά / χιλιάρι βυτίο	Τουλάχιστον 21 ημέρες πριν την συγκομιδή
--------------------------	----------------	---	--

Και

ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΛΚΟΟΛΗΣ

δοσολογία σύμφωνα με την ετικέτα του σκευάσματος

-Πριν τον ψεκασμό να απομακρυνθούν τα μελίτσια, να τηρηθούν οι αποστάσεις ψεκασμού από υδάτινους πόρους και να τηρηθούν τα μέτρα ατομικής προστασίας.

-Για οδηγίες εφαρμογής και απορίες οι παραγωγοί καλούνται να επικοινωνήσουν με τους γεωπόνους του προγράμματος Καν(ΕΕ) 611&615 του Αγροτικού Συνεταιρισμού:

6951979267